

nativein เป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปีซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
อินเดีย เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย

ผลไม้สีแดงถึงม่วงเข้มพร้อมเนื้อผลไม้สีขาวนวลถือเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีรสชาติดีที่สุดชนิดหนึ่ง nativein

มีประวัติการใช้ยามายาวนานเพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังบาดแผลและโรคบิด ในอาชุนเวทใช้สำหรับการอักเสบท้องร่วงและหิวเวาโรค

nativein เป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปีซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
อินเดีย เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย

ผลไม้สีแดงถึงม่วงเข้มพร้อมเนื้อผลไม้สีขาวนวลถือเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีรสชาติดีที่สุดชนิดหนึ่ง nativein

มีประวัติการใช้ยามายาวนานเพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังบาดแผลและโรคบิด ในอาชุนเวทใช้สำหรับการอักเสบท้องร่วงและหิวเวาโรค

nativein ได้รับความนิยมทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีให้บริการทางอินเทอร์เน็ตและในร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ

รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือน้ำผลไม้ซึ่งมักขายในรูปแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงน้ำผลไม้ลูกแพร์แอปเปิ้ลและบลูเบอร์รี่

nativein n มีอยู่ในรูปแบบแท็บเล็ตและแคปซูลเช่นกันและเป็นส่วนผสมในครีมต่อต้านริ้วรอยบางชนิด

แม้จะไม่มีหลักฐานสนับสนุนในมนุษย์ แต่ผลิตภัณฑ์ nativein รายการที่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อรักษามะเร็ง

ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

สูตรใหม่

Nativein จะคืนความเบาสบายให้กับขาของคุณ

ลดอาการปวดเมื่อยไม่สบายขา

ปรับโครงสร้างผนังหลอดเลือดให้เป็นปกติ

ป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเส้นเลือดอุดตัน

THAILAND MADE IN THAILAND NATURAL INGREDIENTS SAFETY PRODUCT

โปรโมชันมีถึง 11 : 26 : 28

-50% B1960 B980

กรุณารอกแบบฟอร์มจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ!

ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

สั่งซื้อ

Norton SECURED McAfee SECURE

nativein ประกอบด้วยสารประกอบที่เรียกว่าแซนโทนซึ่งมีฤทธิ์ด้านเชื้อแบคทีเรีย [1] ด้านเชื้อรา [2] ด้านการอักเสบ [3]

ต้านมะเร็ง [4,5] และอะโรมาเทส - ยับยั้ง [6] คุณสมบัติในหลอดทดลองและในการศึกษาในสัตว์ทดลอง

นอกจากนี้ยังแสดงฤทธิ์ป้องกันความเป็นพิษต่อไตที่เกิดจากซีสฟลาซิน [7] และความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่เกิดจากด็อกโซรูบิซิน [8]

ยับยั้งโปรตีน HIV-1 [9] และบล็อกตัวรับฮิสตามีนและเซโรโทนิน [10] สารสกัดจากเปลือกนอกของ nativein

แสดงให้เห็นถึงสารต้านอนุมูลอิสระ [11] และฤทธิ์ต้านมะเร็ง [12]

การศึกษานขนาดเล็กในมนุษย์ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดมีประโยชน์ในการช่วยรักษาโรคปริทันต์ [13] และช่วยควบคุมกลิ่นปาก [14]

จำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกเพื่อกำหนดประโยชน์ต่อสุขภาพและศักยภาพในการต้านมะเร็งของ nativein



NATIVEIN ทางเลือกใหม่ สำหรับเส้นเลือดขาด

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถรักษาอาการของเส้นเลือดขาด อาการบวม และปวดเมื่อยได้เท่านั้น

Nativein ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นด้วยประสิทธิภาพภาพที่เหนือกว่า

1. ช่วยสลายและลดการสะสมลิ่มเลือด
2. ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเลือด



ผลการวิจัยจากการทดลอง **innovaTV 204** แบบแขนเดียวซึ่งนำเสนอในงาน **ESMO Virtual Congress** ในปี 2020 ระบุว่า **tisotumab vedotin** แสดงให้เห็นถึงอัตราการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ (ORR) ที่ 24% (95% CI, 15.9% - 33.3%) ในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบและ / หรือมะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจายที่เคยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดสองเท่าและยาเบวาซิซูแมบ (Avastin) หากเข้าเกณฑ์ 1

ORR ซึ่งได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบการถ่ายภาพอิสระ (IRC) ประกอบด้วยอัตราการตอบสนองที่สมบูรณ์ 7% และอัตราการตอบสนองบางส่วน 17% และระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบสนอง (DOR) คือ 8.3 เดือน (95% CI, 4.2- ไม่ถึง) การตอบสนองส่วนใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยมีเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง 1.4 เดือน (ช่วง 1.1-5.1) และสังเกตเห็นกิจกรรมภายใน 2 รอบการรักษาแรก **Robert L. Coleman** ผู้เขียนนำการศึกษาอธิบายอธิบายใน a การนำเสนอเสมือนจริงระหว่างการประชุม “**nativein**” แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านมะเร็งที่น่าสนใจรวดเร็วและทนทานโดยกระตุ้นให้ PFS และ OS

ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกกำเริบหรือระยะแพร่กระจายก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดสองเท่าร่วมกับ **bevacizumab** หากมีคุณสมบัติเหมาะสม” โคลแมนซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ **The US Oncology** กล่าว เครือข่าย. “
ผลจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า **tisotumab vedotin** มีศักยภาพในการบำบัดแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาซ้ำและ / หรือมะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย”

Nativein



สถาบันสุขภาพและความงาม
นานาชาติ

ขาวสวยและ สุขภาพดี

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ใช้

- ✓ ช่วยลดเส้นเลือดชด ที่สามารถมองเห็นได้ชัด
- ✓ ช่วยป้องกันการลุกลามของเส้นเลือดชด
- ✓ ช่วยลดความปวดเมื่อยและคันบริเวณขา

ราคาปกติ: 1960 ฿

ราคาพิเศษ: 980 ฿

สั่งซื้อ



50%
ส่วนลด



มะเร็งปากมดลูกกำเริบและ /

หรือระยะแพร่กระจายยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในสตรีโคลแมนอธิบายเพิ่มเติมว่ามีความต้องการสูงที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้านทานหรือความก้าวหน้าของ paclitaxel แนวหน้ามาตรฐานที่มีแพลทินัม / topotecan กับ bevacizumab หากมีสิทธิ ปัจจุบันไม่มีตัวเลือกมาตรฐานการดูแลขั้นที่สองสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้

การบำบัดด้วยพิษต่อเซลล์ซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีเดียวพบว่าผลประโยชน์ / ความเสี่ยงที่ไม่ดีโดยมีกิจกรรมที่ จำกัด แม้ว่า pembrolizumab จะมีให้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก PD-L1 ที่เป็นบวก แต่ ORR กับตัวแทนนั้นมีเพียง 14.3% ตามที่รายงานในการศึกษา KEYNOTE-158 ระยะที่ 2 Tisotumab vedotin เป็นคอนจูเกตของแอนติบอดี - ยาที่ใช้ในการตรวจสอบที่มุ่งตรงไปยังเนื้อเยื่อแฟกเตอร์ (TF) และเชื่อมโยงโควาเลนต์กับ MMAE ที่ก่อทวน microtubule ผ่านตัวเชื่อมต่อโปรตีน TF เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในมะเร็งปากมดลูกและเนื้องอกที่เป็นของแข็งอื่น ๆ และเชื่อมโยงกับพยาธิสรีรวิทยาของมะเร็งและการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกร่วมโดยเซลล์เนื้องอกเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเนื้องอกการสร้างเส้นเลือดและการแพร่กระจายใน